

ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.

ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ:	ВЪЗРАСТ В МЕСЕЦИ										ВЪЗРАСТ В ГОДИНИ <i>/КАЛЕНДАРНАТА ГОДИНА НА НАВЪРШВАНЕ НА ВЪЗРАСТТА/</i>					
	при раж- да- нето	от пър- вия ме- сец	от вто- рия ме- сец	от тре- тия ме- сец	от чет- вър- тия ме- сец	от шес- тия ме- сец	от сед- мия ме- сец	от два- наде- сетия ме- сец	от три- наде- сетия ме- сец	от шест- наде- сетия ме- сец	6	7	11	12	17	25+
Туберкулоза (БЦЖ)	БЦЖ (2)						БЦЖ (3)					БЦЖ (4)				
Дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа)			ДТКа	ДТКа	ДТКа					ДТКа (8)	ДТКа			Тдка	Тд	Тд (9)
Полиомиелит (Пи)			Пи	Пи	Пи					Пи (8)	Пи					
Хемофилус инфлуенце тип Б инфекции (ХИБ)			ХИБ	ХИБ	ХИБ					ХИБ (8)						
Вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б)	Хеп. Б (1)	Хеп. Б (5)	Хеп.Б (6)	Хеп.Б (6)	Хеп. Б (6)	Хеп. Б (5)										
Пневмококови инфекции (Пневмо)			Пнев- мо	(7)	Пнев- мо			Пнев- мо (7а)								
Морбили, паротит, рубеола (МПР)									МПР					МПР		

Забележка: Вижте обясненията на цифрите в скоби на следващата страница!

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.

(2): От 48-ия час след раждането.

(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.

(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.

(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.

(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.

(7): (нова - ДВ, бр. 78 от 2019 г.) Не се прилага при децата, родени след 31.12.2019 г.

(7а): (предишна заб. 7, изм. - ДВ, бр. 78 от 2019 г.) Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием при децата, родени преди 01.01.2020 г., и не по-рано от 6 месеца след прилагане на втория прием при децата, родени след 31.12.2019 г.

(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.

(9): Реимунизация през 10 години.